

Esquema de calificación

Noviembre de 2022

**Matemáticas:
Aplicaciones e Interpretación**

Nivel Medio

Prueba 2

© International Baccalaureate Organization 2022

All rights reserved. No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without the prior written permission from the IB. Additionally, the license tied with this product prohibits use of any selected files or extracts from this product. Use by third parties, including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping services or teacher resource digital platforms and app developers, whether fee-covered or not, is prohibited and is a criminal offense.

More information on how to request written permission in the form of a license can be obtained from <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organisation du Baccalauréat International 2022

Tous droits réservés. Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable de l'IB. De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. L'utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s'y limiter, des éditeurs, des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d'aide aux études, des établissements de préparation à l'enseignement supérieur, des fournisseurs de services de planification des programmes d'études, des gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs d'applications, moyennant paiement ou non, est interdite et constitue une infraction pénale.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour obtenir une autorisation écrite sous la forme d'une licence, rendez-vous à l'adresse <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organización del Bachillerato Internacional, 2022

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin la previa autorización por escrito del IB. Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan recursos para docentes mediante plataformas digitales—, ya sea incluido en tasas o no, está prohibido y constituye un delito.

En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una autorización por escrito en forma de licencia: <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

Instrucciones para los examinadores

Abreviaturas

- M** Puntos concedidos por tratar de utilizar un **Método** correcto.
- A** Puntos concedidos por una **Respuesta** (en inglés, *Answer*) o por **Precisión** (en inglés, *Accuracy*); a menudo dependen de los puntos **M** precedentes.
- R** Puntos concedidos por un **Razonamiento** claro.
- AG** Respuesta dada (del inglés *Answer Given*) en la propia pregunta, por lo que no se concede ningún punto.
- FT** Arrastre de error (del inglés *Follow Through*). La práctica de conceder puntos, a pesar de que el alumno haya cometido errores en apartados anteriores, por **sus** métodos/respuestas correctos a partir de resultados incorrectos.

Uso del esquema de calificación

1 General

Conceda los puntos utilizando las anotaciones como se indica en el esquema de calificación p. ej., **M1**, **A2**.

2 Puntuación por método y por respuesta/precisión

- **No** conceda automáticamente la puntuación máxima cuando la respuesta sea correcta; se **debe** comprobar todo el procedimiento (el desarrollo del ejercicio) y puntuar la pregunta conforme al esquema de calificación.
- Por lo general, no se puede conceder **M0** seguido de **A1**, puesto que los puntos **A** dependen de los puntos **M** precedentes (si los hay).
- Cuando se indica en la misma línea una puntuación **M** y otra **A** (p. ej., **M1A1**), esto normalmente significa que se conceda **M1** por **intentar** utilizar un método adecuado (p. ej., sustituir en una fórmula) y **A1** por utilizar los valores **correctos**.
- Cuando aparecen dos o más puntuaciones **A** en la misma línea es porque cada una se puede conceder de manera independiente; así pues, si el primer valor es incorrecto pero los dos siguientes son correctos, se ha de conceder **A0A1A1**. Si las puntuaciones **A1** aparecen en líneas separadas, se asume que dependen una de la otra y, por lo tanto, es poco probable que se otorgue **A0A1**. Sin embargo, cuando dichas puntuaciones sean independientes (por ej, el esquema de calificación las presenta en secuencia, pero en la solución, una no conduce directamente a la otra) esto se ha de comunicar a través de una nota y, por lo tanto, puede otorgarse **A0A1** (por ejemplo).
- Allí donde el esquema de calificación especifique **A3**, **M2**, etc., **no** subdivida las puntuaciones a menos que haya una nota al respecto.
- En la respuesta a una pregunta del tipo “mostrar que” no es necesario volver a escribir la línea **AG**, a no ser que una **Nota** lo indique de manera explícita en el esquema de calificación.
- Una vez que vea en la hoja la respuesta correcta a una pregunta o a un apartado de una pregunta, ignore cualquier desarrollo adicional, incluso si es incorrecto o sugiere que el alumno no ha comprendido bien la pregunta. Esto fomenta un enfoque uniforme para la corrección, menos dependiente del criterio del examinador. Aunque algunos alumnos puedan verse beneficiados en ese elemento concreto de la pregunta, es probable que estos alumnos también pierdan puntos en otros lugares.

- Una excepción a la regla anterior ocurre cuando una respuesta incorrecta del desarrollo adicional se utiliza **en un apartado posterior**. Por ejemplo, cuando un valor exacto correcto viene seguido de una aproximación decimal incorrecta en el primer apartado y, a continuación, se utiliza esta aproximación en el segundo apartado. En esta situación, conceda los puntos **FT** que corresponda, pero no conceda el **A1** final en el primer apartado. Ejemplos:

	Respuesta correcta incluida	Desarrollo adicional incluido	¿Alguna cuestión relacionada con la puntuación FT?	Acción
1.	$8\sqrt{2}$	5,65685... (valor decimal incorrecto)	No. Último apartado de la pregunta.	Conceda A1 en la puntuación final (no penalice el desarrollo adicional incorrecto).
2.	$\frac{35}{72}$	0,468111... (valor decimal incorrecto)	Sí. El valor se utiliza en apartados posteriores.	Conceda A0 en la puntuación final (y pueden otorgarse todos los puntos FT en los apartados posteriores).

3 Puntuaciones implícitas

Las puntuaciones implícitas se muestran entre **paréntesis**; p. ej., (**M1**). Solo se pueden conceder si el alumno ha incluido el procedimiento **correcto** o si dicho procedimiento ha quedado implícito en otro desarrollo/respuesta posterior.

4 Puntuaciones de arrastre de error (solo se aplican después de haberse cometido un error)

Las puntuaciones de arrastre de error (**FT**) se conceden cuando una respuesta incorrecta dada en un **apartado** de una pregunta se utiliza correctamente en los apartados **posteriores** (p. ej., un valor incorrecto del apartado (a) se utiliza en el apartado (d), o un valor incorrecto del subapartado (c)(i) se utiliza en el subapartado (c)(ii)). Por lo general, para poder conceder puntos **FT**, el alumno **tiene que haber incluido el desarrollo del ejercicio** (no tan solo una respuesta final basada en la respuesta incorrecta dada en un apartado anterior). Sin embargo, si todos los puntos que tiene asignados un apartado posterior corresponden a la respuesta o son implícitos, entonces se deben conceder puntos **FT** por su respuesta correcta incluso si no ha incluido el desarrollo.

Por ejemplo: tras una respuesta incorrecta al apartado (a) que se utiliza en apartados posteriores, cuando el esquema de calificación indique (**M1**)**A1** en el apartado posterior, es posible conceder la puntuación máxima por su respuesta correcta **sin que haya incluido ningún desarrollo**. Para preguntas más largas donde todas las puntuaciones son implícitas salvo los puntos de respuesta, esta regla es aplicable pero puede invalidarse mediante una **Nota** en el esquema de calificación.

- Dentro de un apartado dado, una vez que se ha cometido un **error** ya no se pueden conceder más puntos **A** en otras partes del desarrollo que hagan uso de ese error. Sin embargo, sí que se pueden conceder puntos **M** si procede.
- Si la pregunta resulta mucho más sencilla debido a un error, utilice su propio criterio para conceder menos puntos **FT**, reflexionando sobre a qué corresponde cada puntuación y cómo se traslada eso a la versión simplificada.
- Si el error conduce a un resultado inadecuado (p. ej., una probabilidad mayor que 1, $\sin \theta = 1,5$, un valor no entero allí donde hay que dar uno entero), no conceda el/los puntos correspondientes a las respuestas finales.

- Es posible que en el esquema de calificación se utilice la palabra “su(s)” en una descripción; con esto se quiere indicar que los alumnos quizá estén empleando un valor incorrecto.
- Si la respuesta del alumno a la pregunta inicial contradice claramente la información proporcionada en el enunciado de la pregunta, no es apropiado conceder ningún punto **FT** en los apartados posteriores. Esto incluye cuando los alumnos no logran completar correctamente una pregunta del tipo “mostrar que” y, en los siguientes apartados, utilizan su respuesta incorrecta en vez del valor proporcionado en el enunciado.
- Las excepciones a estas reglas de **FT** se indicarán de manera explícita en el esquema de calificación.
- Si un alumno comete un error en un apartado pero obtiene las respuestas correctas en los apartados posteriores, conceda puntos según corresponda, a no ser que el término de instrucción fuera “A partir de lo anterior”.

5 Errores de lectura

Si un alumno comete un error al copiar en su hoja los valores o datos de la pregunta, esto se considera un “error de lectura” (**MR**, del inglés *MisRead*). A un alumno solo se le puede penalizar una vez por un error de lectura dado. Utilice el sello **MR** para indicar que se ha producido un error de lectura y no conceda el primer punto, aunque se trate de un punto **M**, pero conceda todos los demás según corresponda.

- Si la pregunta resulta mucho más sencilla debido al error de lectura (**MR**), utilice su propio criterio para conceder menos puntos.
- Si el **MR** conduce a un resultado inadecuado (p. ej., una probabilidad mayor que 1, $\sin \theta = 1,5$, un valor no entero allí donde hay que dar uno entero), no conceda el/los puntos correspondientes a las respuestas finales.
- Si el alumno comete un error al copiar su propio trabajo, eso **no** es un error de lectura, sino un error ordinario.
- Si el alumno utiliza una respuesta correcta a una pregunta del tipo “mostrar que” con un grado de precisión mayor del que se proporciona en el enunciado, eso **NO** es un error de lectura y se puede obtener la puntuación máxima en el apartado posterior.
- Los errores de lectura (**MR**) solo se pueden aplicar cuando el alumno haya incluido el desarrollo del ejercicio. En aquellas preguntas de calculadora donde no esté incluido el procedimiento y se haya dado una respuesta incorrecta, los examinadores **no** deben inferir que el alumno ha leído/copiado mal los valores de la calculadora.

6 Métodos alternativos

En ocasiones, los alumnos utilizan métodos distintos de los que aparecen en el esquema de calificación. A menos que en la pregunta se especifique qué método se ha de utilizar, el uso de métodos alternativos correctos no se ha de penalizar, sino que se ha de puntuar conforme a lo que indica el esquema de calificación. Si el término de instrucción es “A partir de lo anterior” y no “A partir de lo anterior o de cualquier otro modo”, entonces no se permiten métodos alternativos a no ser que se indique mediante una nota en el esquema de calificación.

- Cuando se incluyen varios métodos alternativos para toda una pregunta, aparecen señalados mediante los encabezamientos **MÉTODO 1**, **MÉTODO 2**, etc.
- Las soluciones alternativas para un apartado dado de una pregunta se indican mediante el encabezamiento **O BIEN... O BIEN**.

7 Formas alternativas

A menos que en la pregunta se especifique lo contrario, **accepte** formas equivalentes.

- Dado que se trata de un examen internacional, acepte todas las formas alternativas de **notación**, por ejemplo 1.9 y 1,9; o 1000, 1,000 y 1.000.
- No acepte respuestas finales escritas con notación de calculadora. Sin embargo, se pueden obtener puntos **M** y puntos **A** intermedios en los que la información se haya presentado utilizando notación de calculadora, siempre que la evidencia refleje claramente el requisito para conceder la puntuación.
- En el esquema de calificación, las formas **numéricas** y **algebraicas** equivalentes suelen aparecer escritas entre paréntesis, justo a continuación de la respuesta.
- En el esquema de calificación, algunas respuestas **equivalentes** suelen aparecer escritas entre paréntesis. En el esquema de calificación no se presentan todas las notaciones/respuestas/métodos equivalentes, y se pide a los examinadores que apliquen su criterio de forma apropiada para evaluar si el trabajo del alumno es equivalente.

8 Formato y precisión de las respuestas

Cuando el grado de precisión se especifique en el enunciado de la pregunta, uno de los puntos se concederá por dar la respuesta con la precisión requerida. Si el grado de precisión no se indica en la pregunta, deben aplicarse las siguientes reglas: *todas las respuestas numéricas deberán ser exactas o aproximadas con tres cifras significativas*.

Cuando se utilicen los valores en apartados posteriores, el esquema de calificación generalmente empleará el valor exacto, si bien los alumnos también pueden usar la respuesta correcta con 3 cifras significativas en los apartados posteriores. El esquema de calificación con frecuencia indicará los valores posteriores que resulten “*de utilizar valores con 3 cifras significativas*”.

Simplificación de las respuestas finales: Se aconseja a los alumnos que den las respuestas finales utilizando una forma matemática adecuada. En general, para conceder una puntuación **A**, se debe completar la aritmética y simplificar cualquier valor que conduzca a un número entero; por

ejemplo, $\sqrt{\frac{25}{4}}$ debe escribirse como $\frac{5}{2}$. Una excepción a lo anterior es la simplificación de

fracciones, donde no se requiere la forma más sencilla (si bien el numerador y el denominador deben ser números enteros); por ejemplo, $\frac{10}{4}$ se puede dejar así o escribirla como $\frac{5}{2}$. Sin

embargo, $\frac{10}{5}$ se debe escribir como 2, dado que se simplifica para dar un número entero.

Las expresiones algebraicas se deben simplificar realizando cualquier operación como la adición y la multiplicación; p. ej., $4e^{2x} \times e^{3x}$ se debe simplificar a $4e^{5x}$, y $4e^{2x} \times e^{3x} - e^{4x} \times e^x$ se debe simplificar a $3e^{5x}$. A no ser que se especifique en la pregunta, no es necesario factorizar las expresiones ni tampoco desarrollar las expresiones factorizadas, de modo que $x(x+1)$ y $x^2 + x$ son ambas aceptables.

Tenga presente: para obtener los puntos **A** intermedios NO es necesario simplificar las respuestas.

9 Calculadoras

No se permite el uso de calculadoras. El uso de cualquier tipo de calculadora durante esta prueba se considera conducta impropia y, como consecuencia de ello, no se le concederá al alumno ninguna calificación final. Si se topa con un ejercicio que sugiera que el alumno ha utilizado algún tipo de calculadora, siga los procedimientos establecidos para abordar la conducta impropia

OR

Para esta prueba se necesita una calculadora de pantalla gráfica, pero si se topa con un ejercicio que sugiera que el alumno ha utilizado algún tipo de calculadora no permitida en los exámenes del PD del IB (p. ej., dispositivos dotados de un sistema algebraico computacional), siga los procedimientos establecidos para abordar la conducta impropia.

10. Presentación del trabajo del alumno

Procedimiento tachado: Si el alumno (en las hojas que contienen sus respuestas) ha trazado una línea cubriendo parte del procedimiento, o ha tachado de algún otro modo parte del procedimiento, no conceda ningún punto por esa parte del procedimiento, a no ser que haya una nota del alumno que indique explícitamente que quiere que se corrija esa parte del procedimiento.

Más de una solución: Cuando un alumno ofrezca dos o más respuestas distintas a una misma pregunta, el examinador solo debe puntuar la primera respuesta, a no ser que el alumno haya indicado lo contrario. Si la presentación de las respuestas hace que resulte difícil juzgar cuál es “la primera”, los examinadores deben aplicar su criterio de manera apropiada para determinarlo.

1. (a) Continua A1
[1 punto]
- (b) $160 - 50 - 62 - 14 - 8$ (M1)
 $(k =) 26$ A1
[2 puntos]
- (c) (i) $20 \leq T < 40$ A1
- (ii) 30 A1
[2 puntos]
- (d) 33,5 (minutos) A2
- Nota:** Conceda puntos de arrastre de error (**FT**) desde su valor de k y su valor central del intervalo. Conceda puntos de arrastre de error (**FT**) desde el subapartado (c)(ii), pero solo si el valor central del intervalo está dentro de su intervalo.
- [2 puntos]
- (e) 112 A1
[1 punto]
- (f) $\frac{22}{160} \left[0,138, 0,1375, 13,75\%, \frac{11}{80} \right]$ A1A1
- Nota:** Conceda **A1** por un numerador correcto, **A1** por un denominador correcto.
- [2 puntos]
- (g) 26 minutos A1
[1 punto]
- (h) $50 - 16$ (M1)
- Nota:** Conceda **M1** si ha incluido los dos cuartiles correctos.
- 34 minutos A1
[2 puntos]

Continúa en la página siguiente...

Continuación de la Pregunta 1

- (i) Sustitución correcta en la fórmula de los valores atípicos **(M1)**
 $50 + 1,5 \times 34$
 $= 101$ **A1**
 $92 < 101$ **O BIEN** el mayor valor del diagrama es < 101 **R1**
 No es un valor atípico **AG**

Nota: Conceda **R1** por su comparación. Otorgue puntos de arrastre de error desde su apartado (h).
 Conceda **R0** si su conclusión es “es un valor atípico”, esto contradice lo que cree Elsie.

[3 puntos]

- (j) **O BIEN**
 El diagrama no es simétrico (o equivalente);
 p. ej., la mediana no está en el centro de la caja o
 las longitudes de los bigotes son (muy) diferentes o sesgada (a la derecha o a la izquierda)

O BIEN
 La media y la mediana son (muy) distintas.

A1

[1 punto]
Total [17 puntos]

2. (a) (i) 19° **A1**

(ii)
$$\frac{BD}{\text{sen } 120^\circ} = \frac{40}{\text{sen } 19^\circ} \quad \text{(M1)(A1)}$$

Nota: Conceda el **M1** por sustituir los valores en el teorema del seno aplicado a BCD y el **A1** si ha sustituido correctamente sus valores.

(BD =) 106 m (106,401...) **A1**

[4 puntos]

(b) **MÉTODO 1 (teorema del coseno)**

$$\cos \text{BAD} = \frac{85^2 + 85^2 - 106,401...^2}{2 \times 85 \times 85} \quad \text{(M1)(A1)}$$

Nota: Conceda el **M1** por sustituir los valores en el teorema del coseno y el **A1** si ha sustituido correctamente sus valores.

77,495 **A1**

Nota: Acepte una respuesta de 77,149, obtenida por haber utilizado la respuesta con 3 cifras significativas del apartado (a). La respuesta final debe estar redondeada a cinco cifras significativas.

MÉTODO 2 (razones trigonométricas en un triángulo rectángulo/triángulos isósceles)

$$\text{sen} \left(\frac{\text{BAD}}{2} \right) = \frac{53,2008...}{85} \quad \text{(A1)(M1)}$$

Nota: Conceda el **A1** si aparece el 53,2008... Conceda el **M1** si ha sustituido correctamente los valores en la razón trigonométrica. Se pueden otorgar puntos de arrastre de error (**FT**) desde el apartado (a).

77,495... **A1**

Nota: Si ha utilizado la respuesta con 3 cifras significativas del apartado (a), la respuesta que se obtiene es 77,1486...

[3 puntos]

Continúa en la página siguiente...

Continuación de la Pregunta 2

(c) **O BIEN**

$$(\text{Área} =) \frac{1}{2} \times 85 \times 85 \times \sin(77^\circ) \quad \text{(M1)(A1)}$$

Nota: Conceda el **M1** por sustituir los valores en la fórmula del área, **A1** por sustituirlos correctamente. Conceda como mucho **(M1)(A1)A0** si se utiliza un ángulo distinto a 77° .

O BIEN

$$(\text{Área} =) \frac{1}{2} \times (2 \times 85 \times \sin(38,5^\circ)) \times (85 \times \cos(38,5^\circ)) \quad \text{(M1)(A1)}$$

Nota: Conceda **M1** por sustituir los valores en la fórmula del área $A = \frac{1}{2}bh$, **A1** por sustituirlos correctamente.

3520 m² (3519,91...) **A1**
[3 puntos]

(d) 85 m **A1** [1 punto]

(e) $85 + 85 + \frac{77}{360} \times 2\pi \times 85$ **(M1)(M1)**

Nota: Conceda **M1** por sustituir correctamente los valores en $\frac{\theta}{360} \times 2\pi \times r$ y **M1** por sumar AB y AD.

284 m (284,231...) **A1**
[3 puntos]

(f) $\frac{77}{360} \times \pi \times (85)^2 - 3519,91\dots$ **(M1)(M1)**

Nota: Conceda **M1** por sustituir correctamente los valores en la fórmula del área de un sector circular y **M1** por restar de ese valor el área obtenida en el apartado (c).

1330 m² (1334,93...) **A1**
[3 puntos]
Total [17 puntos]

3. (a) (i) B	A1
(ii) F	A1 [2 puntos]
(b) Sustitución correcta en la fórmula del punto medio $\frac{8+5}{2}$ $y = 6,5$	(M1) A1
<p>Nota: Para conceder el A1, la respuesta tiene que ser una ecuación.</p>	
	[2 puntos]
(c) Punto medio = (5, 7)	(A1)
Uso correcto de la fórmula de la pendiente $\frac{8-6}{7-3}$ Pendiente de BC = 0,5 Signo contrario y recíproca de la pendiente Pendiente de la perpendicular = -2 $y - 7 = -2(x - 5)$ (o bien $y = -2x + 17$)	(M1) (A1) (M1) A1
<p>Nota: No conceda puntos por arrastre de error FT dentro de este apartado para el A1 final.</p>	
	[5 puntos]
(d) (i) Evidencia de hallar la intersección de dos mediatrices (BC y CD).	(M1)
<p>Nota: Esto se podría ver gráficamente o analíticamente.</p>	
$6,5 - 7 = -2(x - 5)$ O BIEN $6,5 = -2x + 17$	
<p>Nota: Acepte métodos equivalentes que utilicen mediatrices de BD, $y - 5,5 = 4(x - 5)$ O BIEN $y = 4x - 14,5$.</p>	
$x = 5,25, y = 6,5$ O BIEN (5,25, 6,5)	
<p>Nota: El valor de la coordenada x debe ser exacto o redondeado al menos a 3 cifras significativas.</p>	
(ii) Sustitución correcta de <u>sus</u> valores en la fórmula de distancia	(M1)
$\sqrt{(5,25 - 7)^2 + (6,5 - 5)^2}$ $= 2,30 \text{ km} \left(2,30488\dots, \frac{\sqrt{85}}{4} \right)$	 A1
	[4 puntos] Total [13 puntos]

4. (a) (i) $(m =) 54(\%)$ **A1**
 (ii) $(n =) 14(\%)$ **A1**
 (iii) $(p =) 22(\%)$ **A1**
 (iv) $(q =) 10(\%)$ **A1**

Nota: En base a su n , conceda puntos de arrastre de error (**FT**) en (i) y en (iii), pero solo si no se contradice la información dada. Conceda un punto por arrastre de error (**FT**) en (iv) solo si el total es 100%.

[4 puntos]

- (b) 90 (%) **A1**

Nota: Conceda **A0** si la respuesta es un decimal.

[1 punto]

- (c) (i) $0,54 \left(\frac{54}{100}, \frac{27}{50}, 54\% \right)$ **A1**

- (ii) $\frac{54}{64} \left(0,844, \frac{27}{32}, 84,4\%, 0,84375 \right)$ **A1A1**

Nota: Conceda **A1** por un numerador correcto (por ver escritos 0,64 o 64), **A1** por la respuesta final correcta.

[3 puntos]

- (d) (i) Reconocen una distribución binomial con los parámetros correctos. **(M1)**
 $X \sim B(10, 0,68)$

$(P(X = 5) =) 0,123$ (0,122940..., 12,3%) **A1**

- (ii) $1 - P(X \leq 3)$ **O BIEN** $P(X \geq 4)$ **O BIEN** $P(4 \leq X \leq 10)$ **(M1)**
 $0,984$ (0,984497..., 98,4%) **A1**

- (iii) $(0,68)^9 \times 0,32$ **(M1)**
 Por reconocer dos casos posibles **(M1)**

$2 \times ((0,68)^9 \times 0,32)$
 $0,0199$ (0,0198957..., 1,99%) **A1**

[7 puntos]

- (e) **O BIEN**
 La probabilidad no es constante **A1**

O BIEN
 Los sucesos no son independientes **A1**

O BIEN
 Los sucesos deberían modelizarse mediante la distribución hipergeométrica (en lugar de mediante la distribución binomial) **A1**

[1 punto]

Total [16 puntos]

5. (a) (i) $f'(x) = \frac{-2x}{50} + 2 \left(= \frac{-x}{25} + 2, -0,04x + 2 \right)$ **A1A1**

Nota: Conceda **A1** por cada término correcto. Conceda como máximo **A0A1** por escribir términos extra.

(ii) $0 = \frac{-x}{25} + 2$ **O BIEN** un dibujo aproximado de $f'(x)$ donde se indique la intersección con el eje x **M1**
 $x = 50$ **A1**
 $y = 80$ **A1**
 $(50, 80)$

Nota: Conceda **M0A0A1** si están escritas las coordenadas $(50, 80)$ sin mostrar el desarrollo o si se hallan del gráfico de $f(x)$.

[5 puntos]

(b) (i) $\int_0^{70} \frac{-x^2}{50} + 2x + 30 \, dx$ **A1A1**

Nota: Conceda **A1** por una integral correcta, **A1** por unos límites correctos en la ubicación correcta. Conceda como mucho **A0A1** por una integral con límites incorrectos, un integrando correcto y que omite el dx .

(ii) (Área =) $4710 \, \text{m}^2 \left(4713,33\dots, \frac{14140}{3} \right)$ **A2**

[4 puntos]

(c) (i) $\frac{11,4}{4713,33\dots} \times 100\%$ **O BIEN** $\left| \frac{4701,93\dots - 4713,33\dots}{4713,33\dots} \right| \times 100\%$ **(M1)**

Nota: Conceda **(M1)** si ha sustituido correctamente sus valores en la fórmula del porcentaje de error.

$0,242\% \left(0,241867\dots\% \right)$ **A1**

Nota: El símbolo de porcentaje (%) es obligatorio. Acepte $0,242038\dots\%$, que es lo que se obtiene al utilizar 4710.

(ii) **O BIEN** Reducir la anchura de los intervalos (trapezoides) **A1**
O BIEN Aumentar el número de intervalos (trapezoides) **A1**

Nota: Acepte enunciados equivalentes. Conceda **A0** por la respuesta "aumentar los intervalos" ya que es ambigua.

[3 puntos]

Continuación de la Pregunta 5

(d) (i) **O BIEN**
La anchura del cuadrado es $70 - x$ **(M1)**

O BIEN
La longitud del cuadrado es $\frac{-x^2}{50} + 2x + 30$ **(M1)**

Nota: Conceda el **(M1)** si el $70 - x$ aparece aquí o en otro lugar de la pregunta. Acepte $\frac{-x^2}{50} + 2x + 30$, pero solo si esta expresión se identifica explícitamente como una dimensión del cuadrado.

ENTONCES
En función de x , igualan la longitud con la anchura de ED **(M1)**

$$\frac{-x^2}{50} + 2x + 30 = 70 - x$$

$(x = 14,7920... \text{ o bien } 135,21)$
 $(x =) 14,8 \text{ m } (14,7920...)$

A1

Nota: Conceda **MOM0A0** si escriben la respuesta 15 sin un desarrollo que la lo respalde. Conceda como mucho **M1M0A0** por un enfoque que conduce a $A'(x) = 0$. Esto conduce a una base cuadrada que se extiende más allá del límite este de la propiedad. En forma similar, para cualquier solución en la que F no está en el límite norte de la propiedad o GH no está en el límite este.

(ii) **O BIEN**
 $(70 - 14,7920...)^2$ **(M1)**

O BIEN
 $(55,2079...)^2$ **(M1)**

O BIEN
 $\left(\frac{-(14,7920...)^2}{50} + 2(14,7920...) + 30 \right)^2$ **(M1)**

ENTONCES
(Área =) 3050 m^2 (3047,92...) **A1**

Nota: Se pueden otorgar puntos de arrastre de error (**FT**) desde el subapartado (d)(i), siempre que x esté comprendida entre 0 y 70. Conceda como mucho **M1A0** si su respuesta está fuera de su intervalo $[0, 4713,33...]$ obtenido en el apartado (b).

[5 puntos]
Total [17 puntos]